

茵陳五苓散料は、「金匱要略」に収録されている、口渴、尿利減少がある人の、はきけや二日酔い、じんましんに用いられる漢方薬です。

### してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります)  
次の人は服用しないでください

生後3ヶ月未満の乳児。

### 相談すること

#### 1. 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談してください

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
- (3) 今までに薬により発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。

#### 2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談してください

- (1) 服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮ふ	発疹・発赤、かゆみ

(2) 1ヶ月位(嘔吐、二日酔いのむかつきに服用する場合には5~6回)服用しても症状がよくならない場合

### 効能・効果

のどが渴いて、尿が少ないものの次の諸症：嘔吐、じんましん、二日酔いのむかつき、むくみ

### 成分と分量

1包(大人1日量)中に次の成分を含んでいます。

成 分	タクシャ	チョレイ	ケイヒ	ブクリョウ	ビヤクジュツ	インチンコウ
分 量	5.0g	3.0g	2.0g	3.0g	3.0g	4.0g

### 用法・用量

本品1包に、水約500mLを加えて、半量ぐらいまで煎じつめ、熱いうちに煎じかすを除き、煎液を3回に分けて食間に服用してください。本剤は必ず1日分ずつ煎じ、数日分をまとめて煎じないでください。

上記は大人の1日量です。

年 齢	大人(15才以上)	14才~7才	6才~4才	3才~2才	2才未満	3ヶ月未満
服用量	上記の通り	大人の2/3	大人の1/2	大人の1/3	大人の1/4以下	
1日服用回数			3回			服用しないこと

### <用法・用量に関する注意>

- (1) 用法・用量を厳守してください。
- (2) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。
- (3) 1才未満の乳児には、医師の診療を受けさせることを優先し、止むを得ない場合にのみ服用させてください。
- (4) 煎じ液は、必ず熱いうちにかすをこしてください。
- (5) 本剤は必ず1日分ずつ煎じ、数日分をまとめて煎じないでください。

### 保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- (4) 煎じ液は腐敗しやすいので、冷暗所又は冷蔵庫等に保管し、服用時に再加熱して服用してください。
- (5) 生薬を原料として製造していますので、製品の色や味等に多少の差異を生じことがあります。