

葛根黄連黄芩湯は、「傷寒論」に収録されている、急性胃腸炎や口内炎、舌炎、肩こり、不眠に用いられる漢方薬です。

してはいけないこと

（守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります）
次の人は服用しないでください
生後3カ月未満の乳児。

相談すること

1. 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談してください
- （1）医師の治療を受けている人。
 - （2）妊婦又は妊娠していると思われる人。
 - （3）高齢者。
 - （4）次の症状のある人。
むくみ
 - （5）次の診断を受けた人。
高血圧、心臓病、腎臓病
2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談してください
- （1）まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
偽アルドステロン症	尿量が減少する、顔や手足がむくむ、まぶたが重くなる、手がこわばる、血圧が高くなる、頭痛等があらわれる。

（2）1週間位（急性胃腸炎に服用する場合には5～6回）服用しても症状がよくならない場合

3. 長期連用する場合には、医師又は薬剤師に相談してください

効能・効果

急性胃腸炎、口内炎、舌炎、肩こり、不眠

成分と分量

1包（大人1日量）中に次の成分を含んでいます。

成 分	カッコン	オウレン	オウゴン	カンゾウ
分 量	6.0g	3.0g	3.0g	2.0g

用法・用量

本品1包を和紙袋入りのまま、水約500mLを加えて、半量ぐらいまで煎じつめ、和紙袋とともに煎じかすを除き、煎液を3回に分けて食間に服用してください。
上記は大人の1日量です。

年 齢	大人(15才以上)	14才～7才	6才～4才	3才～2才	2才未満	3カ月未満
服用量	上記の通り	大人の2/3	大人の1/2	大人の1/3	大人の1/4以下	服用しないこと
1日服用回数	3回					

＜用法・用量に関連する注意＞

- （1）用法・用量を厳守してください。
- （2）小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。
- （3）1才未満の乳児には、医師の診療を受けさせることを優先し、止むを得ない場合にのみ服用させてください。
- （4）煎じ液は、必ず熱いうちにかすをこしてください。
- （5）本剤は必ず1日分ずつ煎じ、数日分をまとめて煎じないでください。

保管及び取扱い上の注意

- （1）直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください
- （2）小児の手の届かない所に保管してください。
- （3）他の容器に入れ替えないでください。（誤用の原因になったり品質が変わります。）
- （4）煎じ液は腐敗しやすいので、冷暗所又は冷蔵庫等に保管し、服用時に再加熱して服用してください。
- （5）生薬を原料として製造していますので、製品の色や味等に多少の差異を生じることがあります。