

柴胡清肝湯は、「一貫堂方」に収録されている、かんの強い傾向のある小児の、神経症、慢性扁桃腺炎、湿疹に用いられる漢方薬です。

してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります)

次の人は服用しないでください

生後3カ月未満の乳児。

相談すること

1. 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談してください

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 胃腸が弱く下痢しやすい人。
- (3) 今までに薬により発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。
- (4) 次の症状のある人。
むくみ
- (5) 次の診断を受けた人。
高血圧、心臓病、腎臓病

2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談してください

(1) 服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	食欲不振、胃部不快感

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
偽アルドステロン症	尿量が減少する、顔や手足がむくむ、まぶたが重くなる、手がこわばる、血圧が高くなる、頭痛等があらわれる。

(2) 1カ月位服用しても症状がよくならない場合

3. 長期連用する場合には、医師又は薬剤師に相談してください

4. 次の症状があらわれることがあるので、このような症状の継続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師又は薬剤師に相談してください
下痢

5. 本剤の服用により、まれに症状が進行することもあるので、このような場合には、服用を中止し、医師又は薬剤師に相談してください

効能・効果

かんの強い傾向のある小児の次の諸症：神経症、慢性扁桃腺炎、湿疹

成分と分量

1包(大人1日量)中に次の成分を含んでいます。

成 分	サイコ	トウキ	シヤクヤク	センキュウ	ジオウ	オウレン	オウゴン	オウバク
分 量	2.0g	1.5g	1.5g	1.5g	1.5g	1.5g	1.5g	1.5g
	サンシシ	カロコン	ハッカ	カンゾウ	レンギョウ	キキョウ	ゴボウシ	
	1.5g	1.5g	1.5g	1.5g	1.5g	1.5g	1.5g	

用法・用量

本品1包を和紙袋入りのまま、水約500mLを加えて、半量ぐらいいまで煎じつめ、和紙袋とともに煎じかすを除き、煎液を3回に分けて食間に服用してください。(小児に限る)

上記は大人の1日量です。

年 齢	大人(15才以上)	14才～7才	6才～4才	3才～2才	2才未満	3カ月未満
服用量	服用しないこと	大人の2/3	大人の1/2	大人の1/3	大人の1/4以下	服用しないこと
1日服用回数	3回					

<用法・用量に関連する注意>

- (1) 用法・用量を厳守してください。
- (2) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。
- (3) 1才未満の乳児には、医師の診療を受けさせることを優先し、止むを得ない場合にのみ服用させてください。
- (4) 煎じ液は、必ず熱いうちにかすをこしてください。
- (5) 本剤は必ず1日分ずつ煎じ、数日分をまとめて煎じないでください。

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- (4) 煎じ液は腐敗しやすいので、冷暗所又は冷蔵庫等に保管し、服用時に再加熱して服用してください。
- (5) 生薬を原料として製造していますので、製品の色や味等に多少の差異を生じることがあります。