

四物湯は、「和剤局方」を原典とする、血の道症に用いられる漢方薬です。

### 相談すること

- 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談してください
  - 医師の治療を受けている人。
  - 妊婦又は妊娠していると思われる人。
  - 体の虚弱な人（体力の衰えている人、体の弱い人）。
  - 胃腸の弱い人。
  - 下痢しやすい人。
  - 今までに薬により発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。
- 次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談してください
  - 服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
消化器	胃部不快感、食欲不振、腹痛
皮膚	発疹・発赤、かゆみ

- 1カ月位服用しても症状がよくなる場合

- 次の症状があらわれることがあるので、このような症状の継続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師又は薬剤師に相談してください
  - 下痢

### 効能・効果

皮膚が乾燥し、色つやの悪い体質で胃腸障害のない人の次の諸症：産後あるいは流産後の疲労回復、月経不順、冷え症、しもやけ、しみ、血の道症

### 成分と分量

1包（大人1日量）中に次の成分を含んでいます。

成 分	トウキ	ジャクヤク	センキュウ	ジオウ
分 量	3.0g	3.0g	3.0g	3.0g

### 用法・用量

本品1包を和紙袋入りのまま、水約500mLを加えて、半量ぐらいまで煎じつめ、和紙袋とともに煎じかすを除き、煎液を3回に分けて食間に服用してください。

上記は大人の1日量です。

年 齢	大人(15才以上)	14才～7才	6才～4才	4才未満
服用量	上記の通り	大人の2/3	大人の1/2	服用しないこと
1日服用回数	3回			

### <用法・用量に関連する注意>

- 用法・用量を厳守してください。
- 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。
- 煎じ液は、必ず熱いうちにかすをこしてください。
- 本剤は必ず1日ずつ煎じ、数日分をまとめて煎じないでください。

### 保管及び取扱い上の注意

- 直射日光の当たらない、湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- 小児の手の届かない所に保管してください。
- 他の容器に入れ替えないでください。（誤用の原因になったり品質が変わります。）
- 煎じ液は腐敗しやすいので、冷暗所又は冷蔵庫等に保管し、服用時に再加熱して服用してください。
- 生薬を原料として製造していますので、製品の色や味等に多少の差異を生じることがあります。