

独活葛根湯は、「外台秘要」に収録されている、五十肩、肩こりに用いられる漢方薬です。

相談すること

1. 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談してください

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
- (3) 体の虚弱な人（体力の衰えている人、体の弱い人）。
- (4) 胃腸が弱く下痢しやすい人。
- (5) 発汗傾向の著しい人。
- (6) 高齢者。
- (7) 今までに薬により発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。
- (8) 次の症状のある人。
むくみ、排尿困難
- (9) 次の診断を受けた人。
高血圧、心臓病、腎臓病、甲状腺機能障害

2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談してください

(1) 服用後、次の症状があらわれた場合

| 関係部位 | 症 状 |
|------|------------|
| 皮ふ | 発疹・発赤、かゆみ |
| 消化器 | 食欲不振、胃部不快感 |

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

| 症状の名称 | 症 状 |
|-----------|---|
| 偽アルドステロン症 | 尿量が減少する、顔や手足がむくむ、まぶたが重くなる、手がこわばる、血圧が高くなる、頭痛等があらわれる。 |

(2) 1カ月位服用しても症状がよくならない場合

3. 長期連用する場合には、医師又は薬剤師に相談してください

効能・効果

五十肩、肩こり

成分と分量

1包（大人1日量）中に次の成分を含んでいます。

| 成 分 | カッコン | ケイヒ | シャクヤク | マオウ | ショウキョウ | ジオウ | タイソウ | カンゾウ | ドクカツ |
|-----|------|------|-------|------|--------|------|------|------|------|
| 分 量 | 5.0g | 3.0g | 3.0g | 2.0g | 0.5g | 4.0g | 1.0g | 1.0g | 2.0g |

用法・用量

本品1包を和紙袋入りのまま、水約500mLを加えて、半量くらいまで煎じつめ、和紙袋とともに煎じかすを除き、煎液を3回に分けて食間に服用してください。

上記は大人の1日量です。

| | | |
|--------|-----------|---------|
| 年 齢 | 大人(15才以上) | 15才未満 |
| 服用量 | 上記の通り | 服用しないこと |
| 1日服用回数 | 3回 | |

<用法・用量に関連する注意>

- (1) 用法・用量を厳守してください。
- (2) 煎じ液は、必ず熱いうちにかすをこしてください。
- (3) 本剤は必ず1日分ずつ煎じ、数日分をまとめて煎じないでください。

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない、湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。（誤用の原因になったり品質が変わります。）
- (4) 煎じ液は腐敗しやすいので、冷暗所又は冷蔵庫等に保管し、服用時に再加熱して服用してください。
- (5) 生薬を原料として製造しているので、製品の色や味等に多少の差異を生じることがあります。