

二朮湯は、「万病回春」に収録されている、五十肩に用いられる漢方薬です。

相談すること

1. 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談してください

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
- (3) 高齢者。
- (4) 今までに薬により発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。
- (5) 次の症状のある人。
むくみ
- (6) 次の診断を受けた人。
高血圧、心臓病、腎臓病

2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談してください

(1) 服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮ふ	発疹・発赤、かゆみ

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
偽アルドステロン症	尿量が減少する、顔や手足がむくむ、まぶたが重くなる、手がこわばる、血圧が高くなる、頭痛等があらわれる。
肝機能障害	全身のだるさ、黄疸（皮ふや白目が黄色くなる）等があらわれる。

(2) 1カ月位服用しても症状がよくなる場合

3. 長期連用する場合には、医師又は薬剤師に相談してください

効能・効果

五十肩

成分と分量

1包（大人1日量）中に次の成分を含んでいます。

成 分	ビャクジュツ	ブクリョウ	チンピ	コウブシ	オウゴン	ソウジュツ
分 量	1.5g	1.5g	1.5g	1.5g	1.5g	1.5g
	テンナンショウ	イレイセン	キョウカツ	ハンゲ	カンゾウ	ショウキョウ
	1.5g	1.5g	1.5g	2.0g	1.5g	0.6g

用法・用量

本品1包を和紙袋入りのまま、水約500mLを加えて、半量くらいまで煎じつめ、和紙袋とともに煎じかすを除き、煎液を3回に分けて食間に服用してください。

上記は大人の1日量です。

年 齢	大人(15才以上)	15才未満
服用量	上記の通り	服用しないこと
1日服用回数	3回	

<用法・用量に関連する注意>

- (1) 用法・用量を厳守してください。
- (2) 煎じ液は、必ず熱いうちにかすをこしてください。
- (3) 本剤は必ず1日分ずつ煎じ、数日分をまとめて煎じないでください。

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない、湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。（誤用の原因になったり品質が変わります。）
- (4) 煎じ液は腐敗しやすいので、冷暗所又は冷蔵庫等に保管し、服用時に再加熱して服用してください。
- (5) 生薬を原料として製造しているため、製品の色や味等に多少の差異を生じることがあります。