

排膿散料は、「金匱要略」に収録されている、化膿性皮膚疾患の初期又は軽いものに用いられる漢方薬です。

### してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります)  
次の人は服用しないでください  
生後3カ月未満の乳児。

### 相談すること

- 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談してください
  - 医師の治療を受けている人。
  - 妊婦又は妊娠していると思われる人。
- 次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談してください
  - 服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
消化器	胃部不快感

- 5～6日間服用しても症状がよくならない場合

### 効能・効果

化膿性皮膚疾患の初期又は軽いもの

### 成分と分量

1包(大人1日量)中に次の成分を含んでいます。

成 分	キジツ	ジャクヤク	キキョウ
分 量	3.0g	3.0g	1.5g

### 用法・用量

本品1包に水約500mLを加えて、半量くらいまで煎じつめ、熱いうちに煎じかすを除き、煎液を3回に分けて食間に服用してください。本剤は必ず1日分ずつ煎じ、数日分をまとめて煎じないでください。  
上記は大人の1日量です。

年 齢	大人(15才以上)	14才～7才	6才～4才	3才～2才	2才未満	3カ月未満
服用量	上記の通り	大人の2/3	大人の1/2	大人の1/3	大人の1/4以下	服用しないこと
1日服用回数	3回					

### <用法・用量に関連する注意>

- 用法・用量を厳守してください。
- 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。
- 1才未満の乳児には、医師の診療を受けさせることを優先し、止むを得ない場合のみ服用させてください。
- 煎じ液は、必ず熱いうちにかすをこしてください。
- 本剤は必ず1日分ずつ煎じ、数日分をまとめて煎じないでください。

### 保管及び取扱い上の注意

- 直射日光の当たらない、湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- 小児の手の届かない所に保管してください。
- 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- 煎じ液は腐敗しやすいので、冷暗所又は冷蔵庫等に保管し、服用時に再加熱して服用してください。
- 生薬を原料として製造しているので、製品の色や味等に多少の差異を生じることがあります。