

茯苓飲加半夏は、「類聚方広義」に記載された、はきげや胸やけがあり尿量が減少する人の、胃疾患に用いられる漢方薬です。

してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります)
次の人は服用しないでください
生後3カ月未満の乳児。

相談すること

- 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談してください
 - 医師の治療を受けている人。
 - 妊婦又は妊娠していると思われる人。
 - 今までに薬により発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。
- 次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談してください
 - 服用後、次の症状があらわれた場合

| 関係部位 | 症 状 |
|------|-----------|
| 皮ふ | 発疹・発赤、かゆみ |

- 1カ月位（胃炎、溜飲に服用する場合には1週間位）服用しても症状がよくなる場合

- 長期連用する場合には、医師又は薬剤師に相談してください

効能・効果

はきげや胸やけがあり尿量が減少するものの次の諸症：胃炎，胃アトニー，溜飲

成分と分量

1包（大人1日量）中に次の成分を含んでいます。

| 成 分 | ブクリョウ | ビャクジュツ | ニンジン | ショウキョウ | チンピ | キジツ | ハンゲ |
|-----|-------|--------|------|--------|------|------|------|
| 分 量 | 5.0g | 4.0g | 3.0g | 1.0g | 3.0g | 1.5g | 4.0g |

用法・用量

本品1包を和紙袋入りのまま、水約500mLを加えて、半量くらいまで煎じつめ、和紙袋とともに煎じかすを除き、煎液を3回に分けて食間に服用してください。

上記は大人の1日量です。

| 年 齢 | 大人(15才以上) | 14才～7才 | 6才～4才 | 3才～2才 | 2才未満 | 3カ月未満 |
|--------|-----------|--------|--------|--------|----------|---------|
| 服用量 | 上記の通り | 大人の2/3 | 大人の1/2 | 大人の1/3 | 大人の1/4以下 | 服用しないこと |
| 1日服用回数 | 3回 | | | | | |

<用法・用量に関連する注意>

- 用法・用量を厳守してください。
- 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。
- 1才未満の乳児には、医師の診療を受けさせることを優先し、止むを得ない場合のみ服用させてください。
- 煎じ液は、必ず熱いうちにかすをこしてください。
- 本剤は、必ず1日分ずつ煎じ、数日分をまとめて煎じないでください。

保管及び取扱い上の注意

- 直射日光の当たらない、湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- 小児の手の届かない所に保管してください。
- 他の容器に入れ替えないでください。（誤用の原因になったり品質が変わります。）
- 煎じ液は腐敗しやすいので、冷暗所又は冷蔵庫等に保管し、服用時に再加熱して服用してください。
- 生薬を原料として製造しているため、製品の色や味等に多少の差異を生じることがあります。