

麻杏甘石湯は、「傷寒論」に記載され、気管支ぜんそく、気管支炎に用いられる漢方薬です。

### してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります)  
次の人は服用しないでください  
生後3カ月未満の乳児。

### 相談すること

#### 1. 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談してください

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
- (3) 体の虚弱な人(体力の衰えている人、体の弱い人)で軟便下痢になりやすい人。
- (4) 胃腸の弱い人。
- (5) 発汗傾向の著しい人。
- (6) 高齢者。
- (7) 次の症状のある人。  
むくみ、排尿困難
- (8) 次の診断を受けた人。  
高血圧、心臓病、腎臓病、甲状腺機能障害

#### 2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談してください

- (1) 服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮ふ	発疹・発赤、かゆみ
消化器	悪心、食欲不振、胃部不快感

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
偽アルドステロン症	尿量が減少する、顔や手足がむくむ、まぶたが重くなる、手がこわばる、血圧が高くなる、頭痛等があらわれる。

- (2) 1カ月位服用しても症状がよくなる場合

#### 3. 長期連用する場合には、医師又は薬剤師に相談してください

### 効能・効果

せきがはげしく、発作時に喘鳴や頭部発汗を伴うもの  
気管支ぜんそく、気管支炎

### 成分と分量

1包(大人1日量)中に次の成分を含んでいます。

成 分	マオウ	キョウニン	カンゾウ	セッコウ
分 量	4.0g	3.5g	2.0g	8.0g

### 用法・用量

本品1包を和紙袋入りのまま、水約500mLを加えて、半量くらいまで煎じつめ、和紙袋とともに煎じかすを除き、煎液を3回に分けて食間に服用してください。

上記は大人の1日量です。

年 齢	大人(15才以上)	14才～7才	6才～4才	3才～2才	2才未満	3カ月未満
服用量	上記の通り	大人の2/3	大人の1/2	大人の1/3	大人の1/4以下	服用しないこと
1日服用回数	3回					

### <用法・用量に関連する注意>

- (1) 用法・用量を厳守してください。
- (2) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。
- (3) 1才未満の乳児には、医師の診療を受けさせることを優先し、止むを得ない場合にのみ服用させてください。
- (4) 煎じ液は、必ず熱いうちにかすをこしてください。
- (5) 本剤は、必ず1日分ずつ煎じ、数日分をまとめて煎じないでください。

### 保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない、湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- (4) 煎じ液は腐敗しやすいので、冷暗所又は冷蔵庫等に保管し、服用時に再加熱して服用してください。
- (5) 生薬を原料として製造しているので、製品の色や味等に多少の差異を生じることがあります。

■お問い合わせ先：ユタカ薬局宇治 京都府宇治市宇治樋ノ尻79-1 TEL：0774-28-3392

■製造販売元：株式会社ユタカファーマシー 京都府宇治市宇治樋ノ尻79-1